Auszug aus dem Verzeichniße der Glas- und Treibhaus-Pflanzen, welche in dem k. Garten zu Herrenhausen bei Hannover gegen baare Bezahlung in Conventions-Münze, (die vollwichtige L'ouisdor zu 5 Rthlr. 8 gr., und den Dukaten zu 3 Rthlr. gerechnet) abzustehen sind:

	Rthlr.	gr.
Acacia acanthocarpa W. w.	—	12
— armata, R. Br. g.	—	12
— caracasana W. w.	—	8
— connigera, W. w.	1	—
— lyclopes, H. Angl. g.	1	—
— decipiens, R. Br. g.	—	16
— diptera, H. et B. w.	—	8
— geniculata, Wendt. fol. w	—	8
— lophanta, W. g.	—	12
— mucronata, W. g.	—	12
— myrtifolia, W. g.	—	12
— nigricans, R. Br. g.	—	16
— stricta. W. g.	—	8
— tetragona, W. w.	—	8
— verticillata, W. g.	—	12
— viscosa, Schrad. g.	—	12
Acer sempervirens, L. g.	—	6
Achania mollis, Ait. w.	—	6
Aegiphila martinicensis, L. w.	—	12
Agathosma acuminata, W. g.	—	8
— apiculata, Meyer. g.	—	16
— cerefolium, B. et W. g.	—	12
— cuspidata §. bruniades, g.	—	8
— hybrida, B. et W. g.	—	12
— imbricata, W. g.	—	8
— — virgata g.	—	8
— laxa, B. et W. g.	—	12
— obtusa, B. et W. g.	—	8
— — §. lanceolata, g.	—	8
— tenella, B. et W. g.	—	12
— Ventenatiana, B. et W. g.	—	8
— villosa, W. g.	—	12
Allamanda verticillata, Deff. w.	1	12
Aloe arborescens, DC. g.	—	4
— brevifoliá, DC g.	—	4
— elongata, Murr. g.	—	4
— humilis, Th. g.	—	6
— pulchra Haworth g.	—	6
Alpinia calcarata. Roscoe. w.	—	6
— nutans: Roscoe. w. (Zerumbet speciosum)	—	6
Amaryllis aurea, Ait. g.	—	6
-- crocata Ker: g.	—	12
Amaryllis equestris, Att. g.	—	12
— vittata, Act. g.	—	8
Anthoceris littorea, Labill. g.	—	12
Anthospermum aethiopicum, L. g.	—	6
Anthyllis Hermaniae, L. g.	—	6
Antidesma alexiteria, L. w.	—	12
Apicra foliosa, W. g.	—	8
— reticulata, W. g.	—	6
Aralia capitata, L. w.	—	8
Ardisia acuminata, W. w.	—	12
Aristolochia altissima, Deff. g.	—	6
Arum? ramosum, H. Angl. w.	—	6
Aspidium capense, Sw. g.	—	6
— exaltatum, Sw. w.	—	6
— pectinatum, W. w.	—	4
Aster aculeatus, Labill. g.	—	4
— angustifolia, Jacq.. g.	—	6
— argophyllus, Labill. g.	—	8
— carolinianas: Walt. g.	—	6
— ferrugineus: Wendl. fol. g.	—	6
— filifolius, Vent. g.	—	6
— fruticulosus: L. g.	—	8
— stellalatus, Labill. g.	—	6
— tomentosus: Wendl. g.	—	6
Aucuba japonica, Th. g.	—	6
Baccharis adnata, H. et B. w.	—	6
Banisteria chrysophylla, Cav. w.	1	—
— ciliata, Cay. w.	—	16
Banksia ericifolia, L. g.	2	—
— latifolia. R. Br. g.	2	8
— oblongifolia, Cav. g.	2	—
— paludosa, R. Br. g.	2	12
— reticulata? g.	2	12
— Barleria flava Jacq. fol. w.	—	6
— Prionitio, S. w.	—	6
Bauhinia aculeata S. w.	—	16
— anatomica, H. Angl. w.	1	—
— forficata, Link. w.	—	12
Begonia acuminata. Dryand. w.	—	8
— argyrostigma L. et O. w.	—	12
— discolor, Ait. w.	—	8
— ulmifolia, W. w.	—	8
Berckheya incana, W. g.	—	6
Bignonia aequinoctialis L. w.	—	8
— capreolata, L. g.	—	8
— echinata, L. w.	—	12
— grandiflora Th. g.	—	16
— grandifolia, Jacq. w.	—	16
— lactiflora, Vahl. w.	—	12
— pandorana Andr. g.	—	8
— rigescens, Jacq. w.	—	8
— stans: L. w.	—	12
Bixa Orellana L. w.	—	8
Bletia verecunda R. Br. w. (Cymbidium)	—	8
Brachysema undulata, R. Br. g.	—	16
Brunia abrotanoides L. g.	—	8
-- elegans: Hort. Angl. g.	—	16
— ericoides: Wendl. g.	—	12
— lanuginosa, L. g.	—	12
— paleacea, L. g.	—	12
Buddleja globosa, Lam. g.	—	8
— . salvifolia, Ait. g.	—	6
Bumelia lycioides W. g.	—	6
— . tenax, W. g.	—	6
Bystropogon canariense L'H. g.	—	4
— . punctatum L'H. g.	—	4
Cacalia canescens: W. g.	—	8
Cactus abnormis, W. w.	—	16
-- alatus: Sw. w.	—	8
-- multangularis W. w.	—	12
-- niger. Dyck. w.	—	16
-- repandus L. w.	—	6
-- serpentinus: W. w.	—	6
-- speciosus: W. w.	—	8
-- truncatus: Jacq. fol. w.	—	12
Calendula fruticosa, L. g.	—	6
-- . graminifolia L. g.	—	8
Callicarpa lanata, L. w.	—	8
Calothamnus quadrifidus R. Br. g	—	12
Calytrix glabra, Smith. g.	—	16
Camellia japon. L. g. simpl. 16gr. bis	1	—
-- . -- fl. pl. anemoniflora	3	8
-- . -- -- carnea	3	—
-- . -- -- expansa	3	—
-- . -- -- paeoniflora	3	—

	Rthlr.	gr.
Camellia pomponia . . .	3	—
-- . -- rubra	3	—
-- . -- -- variegat. . .	3	—
-- . -- fl. albo simplex . .	3	—
-- . Sasanqua, Th. g. . . .	2	16
Canna excelsa: Wendl. w. .	—	6
Glauca. L. w.	—	8
Capparis Cynophallophora L. w.	—	6
— . longifolia, Sw. w. . .	1	—
Carica microcorpa, Jacq. w. .	—	12
Carlonicia salicifolia, Woench. g	—	6
Cassine capensis. L. g. . . .	—	6
-- . Maurocenia L. g. . . .	—	8
Casuarina distylla, Vent. g. .	—	12
— . repens: H. Angl. g. .	—	16
— . tortuosa, Ait. g. . .	—	12
Cecropia palmata. W. w. . .	3	—
Cirbera Thevetia, Jacq. w. .	1	—
Cestrum cauliflorum, Jacq. w.	—	12
— salicifolium, Iacq. w. . .	—	6
— undulatum, R. et P. w. . .	—	6
Chimonanthus praecox Link. g. (Calycanthus praecox)	—	16
Chironia linoides L. g. . .	—	8
Chloranthus inconspicuus, L. w.	—	8
Chlorophytum inornatum Sinis. w.		6
Chrysocoma ciliaris: L. g. .	—	6
Chrysophyllum Cainito L. w. .	1	—
— ferugineum, Hortol. w. .	2	—
-- glabrum, Jacq. w. . . .	1	—
Cineraria canescens, Wendl. fol. g.		6
— linifolia L. g.	—	6
-- petasites, Sinis g.	—	12
Cistus ladaniferus: L. g. . .	—	8
-- -- angustifol, g. . .	—	8
-- laurifolius: Lam. g. . . .	—	8
Clethra arborea, Ait. g. . .	—	8
Cliffortia ilicifolia, L. g. . .	—	6
-- obcordata, L. g.	—	6
-- tridentata, W. g.	—	8
-- trifoliata, L. g.	—	6
Clusia flava, L. w.	1	—
Coccoloba longifolia, H. Angl.	1	—
-- punctata, Mull. w. . . .	—	16
-- uvifera, L. w.	1	—
Commersoria dasyphylla, Cort. g.	—	6
Cookia punctata, L. w. . . .	—	16
Corea alba, Ait g.	—	6
Costus speciosus, Smith w. .	—	6
Crassula coccinea, L. g. . .	—	8

	Rthlr.	gr.
Crassula cordata, L. g. . .	—	6
-- marginalis, Ait. . : .	—	4
-- perfilata, Scop. g. . .	—	6
-- perfoliata, L. g. . . .	—	6
Crinum americanum, L. w. .	—	12
-- erubescens: Ait w. . . . (C. Commelini)	—	12
-- longifolium, Wendl. g. . . (Amaryllis longifolia)	—	8
Croton polyandrum, Korb. w.	—	12
-- tomentosum H. P. w. . .	—	8
Cupressus lusitanica, Mill. g.	—	8
-- sempervirens: L. g. . .	—	8
-- bacciformis: Wendl. g. .	—	6
Carculigo latifolia, Korb. w. .	—	16
Cyclopia genistoides: Vent. g.	—	16
Cymbidium aloifolium, Sw. w.	—	8
-- reflexum, R. Br. g . .	—	16
Cynanchum pilosum R. Br. g	—	4
Cytisus argenteus: L. g .	—	4
Digitalis canariensis, L. g .	—	8
Diosma cupressina, L. g .	—	12
-- longifolia, Wendl. g. .	—	12
Dodonaea angustifolia, L. g .	—	8
-- triquetra, Wendl g . .	—	8
Dracaena terminalis: L. w. .	—	16
Drimia lancaefolia, Lood. w.	—	8
Duranta microphylla, Deff. w.	—	6
-- Plumieri, L. w.	—	6
Echium salmonticum, Lagass. g	—	6
Edwaresia mycrophylla, Solisb. g		8
Ehretia tinifolia, L. w. . .	—	6
Elaeagnus acuminata, Link. g	—	8
Elaeodendron australe, Vent. g	—	16
-- orientale, Jacq. w. . .	1	12
Elichrysum fasciculatum, W. g	—	8
Epidendrum elongatum Jacq. w.	—	12
Eranthemum bicolor, Schrank w.	—	6
Erica andromaediflora, Ait, g	1	8
-- arborea L. g	—	8
-- assurgens: Link. g . .	—	12
-- baccans, L. g. . . .	—	8
-- blanda, Andr. g. . .	—	16
-- caffra, L. g. . . .	—	12
-- calycina, L. g. . . .	—	12
-- capitata, L. g. . . .	1	—
-- cerinthoides L. g. . .	1	16
-- ciliaris, L. g. . . .	—	8
-- concirna, Adr. g. . .	—	12
-- -- fl. rubra g . .	—	12

	Rthlr.	gr.
Erica conspicua Ait. g . .	1	8
-- cruenta, Andr. g . .	1	—
-- cylindrica, Andr. g . .	1	8
-- divaricata elatior, g . .	—	16
-- empetrifolia, L. g . .	—	12
-- fascicularis, Ait g. . .	1	
-- fibula, Link. g. . .	1	—
-- fagax, Salisb. g. . .	—	8
-- gilva, Wendl. g. . .	—	12
-- gracilis: Wendl. g. . .	—	12
-- Halicacoba L. g. . .	—	16
-- herbacea, L. g. . .	—	12
-- hispida morifolia, g . .	—	12
-- hispidula, L. g . . .	—	12
-- hybrida H. Angl. g . .	—	16
-- lactea, Hortal, g. . .	—	16
-- laevis, Andr. g . . .	—	12
-- laniflora, Wendl. g. . .	—	16
-- mammosa, L. g. . .	1	—
-- margaritacea, Ait g . .	—	12
-- marifolia, Ait. g. . .	—	12
-- multumbellifera, W. g .	—	16
-- nigrita L. g. . . .	—	12
-- olula, Wendl. g . .	1	8
-- pellucida, Andr. g. . .	1	—
-- pendula, Wendl. g . .	—	8
-- Petiverii, L. g . . .	1	—
-- phylicoides, W. g. . .	—	12
-- Plackenetii, L. g. . .	1	8
-- pubescens minor. g . .	1	—
-- Sebana Donn. g. . .	1	—
-- sexfaria, Ait. g . .	1	—
-- tenuifolia, L. g . .	—	12
-- tenuis: Salisb. g. . .	—	16
-- translascens: Wendl. g	1	8
-- triflora, L. g . . .	—	8
-- trossula, W. g. . . .	1	8
-- tubiflora, L. g . . .	—	16
-- Uhria villosa, g . .	1	16
-- vagans, L. g . . .	—	6
-- verticillata, Andr. g . .	1	8
-- vesicaria, Wendl. g . .	1	8
-- viridipurpurea, L. g . .	—	12
-- -- procumbens g .	—	8
-- Walkeria, Andr. g . .	1	8
Erigeron glaucum, S. et Reg. g	—	8
Eucalyptus corymbosa Smith. g	2	—
-- incrassata, Labill. g . .	1	—
-- obliqua, Smith. g . .	2	—
-- perfoliata, H. Angl. g .	2	—

	Rthlr.	gr.
Eucalyptus viminalis, Labill. g.	1	16
Eugenia australis, Wendl. g	--	8
= elliptica, Smith. g .	--	8
= Euphorbia canariensis: L.w.	--	6
= Histrix Jacq. w. . .	--	6
= meloformis, Ait w. .	--	10
Eutaxia myrtifolia, R. Br, g .	--	16
Exacum viscosum, Smith. g .	--	4
Fabricia myrtifolia, Goert. g .	--	12
Ficus australis: W. g. . .	--	8
= elastica Roxb. w. . .	1	--
= heterophylla, L. w. .	--	6
= Lichtensteinii, L. g .	--	12
= ulmifolia, Lam. g. .	--	8
Gaertnera racemosa, Roxb. g	--	12
Gardenia florida fl. pl. g .	--	12
= radicans, Th. g. . .	1	8
= Thunbergia L. g. . .	1	16
Garuga pinnata: Roxb. g .	--	6
Gazania heterophylla, W. fol. g	--	6
Geranium anemonifolium S'H. g.		6
Gesneria bulbosa, B. et Reg. w.	--	8
= praesinata, B. et Reg. w. .	--	6
Globularia longifolia, Ait. g .	--	6
Gloriosa superba, L. w. .	--	8
Gloxinia speciosa. Ker. w. .	--	12
Gnaphalium apiculatum, Lab. g	--	8
= conicum, W. g . .	--	6
= floridum Hortal. g .	--	6
= fruticans, L. g . .	--	6
= grandiflorum L. g . .	--	8
= helianthemifolium, L. g	--	6
= lasiocaulen, Link g .	--	6
= microphyllum, W. g .	--	4
= strictum. Lam. g . .	--	6
Gnidia aurea Anglor. g . .	--	12
= simplex, L. G. . .	--	8
Gomphocarpus arborescens R.Br g.		6
= frutescens R. Br. g . .	--	6
Goodenia ovata, Smith. g .	--	8
Grewia occidentalis, L. g .	--	12
Hakea acicularis, R. Br. g .	--	16
= carduifolia. H. Angl. g.	--	16
= florida, R. Br. g . .	--	16
= glabra, Wendl. g . .	--	12
= linearis. R. Br. g. . .	1	--
= oleifolia R. Br. g. . .	--	12
= pugioniformis, Cav. g .	--	12
= saligna, R. Br. g. . .	--	12
= suaveolens, R. Br. g .	--	16

	Rthlr.	gr.
Haloragis capenses, Hortal. g	--	8
Hamellia patens. L. w. .	--	8
Harrachia speciosa. Jacq. fol. w.	--	8
Hedychium coronarium. Ker. w.	--	6
Heliconia psittacorum, L. w.	--	8
Helicteris baruensis, L. w.	--	8
- jamaicensis: Sw. w. .	--	8
Hemimeris urticifolia. W. g.	--	8
Hermannia alnifolia, L. g.	--	6
= angularis Jacq. g. .	--	6
= candicans, Ait. g. .	--	8
= cuneifolia. Jacq. g. .	--	6
= decumbens, W. g. . .	--	6
= disticha, Sch. et Wendl. g.		6
= flammula Jacq. g. . .	—	8
= hirsuta. Sch. et Wendl. g.	—	6
- holosericea, Jacq. g. .	—	8
= lavandulifolia, L. g. .	—	8
= micans, Sch. et Wendl g.	—	8
= racemosa, H. Angl. g.	—	8
= scabra, Jacq. g. . .	—	6
Hibbertia grossulariaefolia Salisb. g.	—	8
— volubilis, Andr. g. .	—	8
Hibiscus Rosa sinensis L. w. .	—	12
= = fl. pl. w. .	—	12
= = fl. pl. luteo .	—	12
= tricaspis, Cav. w. . .	—	8
Hosta coerulea, Jacq. w. .	—	8
Hura crepitans, L. w. . .	—	8
Hypericum balearicum L. g .	—	6
= canariense, L. g. . .	—	6
Jasminum gracile, Ait. w. .	—	8
= revolutum sinis g. .	—	8
= Sambac undulatum w.	1	—
= tortuosum, W. w. . .	—	12
= undulatum, W. w. .	—	12
Ilex salicifolia, Jacq. g . .	—	8
Illicium anisatum, L. g. .	1	—
Inga Unguis Cati. W. w. .	—	16
Ipomaea ternata, Jacq. w. .	—	12
Justicia Ecbolium, L. w. .	—	8
= Gendarussa, L. w. .	—	6
= picta, L. w. . . .	—	8
= spinosa, L. w. . .	—	6
Ixodia Achillaeoides, R. Br. g	—	6
Krameria dubia. Hortal. w.	—	8
Lachenalia lancaefolia, Jacq. g	—	6
Lasiopetalum purpureum, Ait. g	—	16
= solanaceum, Sinis g. .	—	8

	Rthlr.	gr.
Laurus carolinensis: Mich. g.	—	12
= indica, L. g. . . .	—	8
Lavatera acerifolia, Pers. g .	—	8
Lebeckia cytisoides: Th. g .	—	8
Leptospermum acuminatum W. g		8
= ambiguum, Smith. g . .	—	8
= baccatum, Smith. g. .	—	8
= emarginatum Wendl. fol. g.		8
= grandiflorum. g. . . .	—	8
= grandifolium. Smith . .	—	8
= juniperinum, Smith g. .	—	8
= laevigatum, g. . .	—	8
= lanigerum, Smith . .	—	8
= mucronatum . . .	—	8
= obovatum, Wendl. fol. g.	—	12
= pubescens, W. g. . .	—	8
= rigidum, g. . . .	—	8
= rubricaule, Cels. g. .	—	8
= scabrum, g. . . .	—	8
= scoparium, Smith, g. .	—	8
= sericeum: Labill. g. .	—	12
- tenuifolium g. . . .	—	8
= Thea W. g. . . .	—	8
= thyriifolia, Hortal g .	—	8
Lettsomia splendens, H. Gott. w. .	—	12
Leucodendron buxifolium R. Br. .	—	12
laevisonus, R. Br. g. .	—	12
strictum, R. Br. . .	—	12
Leucopogon juniperinus R.Br.	—	8
Leysera gnaphaloides: l. g.		12
Lidbeckia pectinata, Th. g. .		6
Ligustrum lucidum, Ait. g. .		6
Limonia mauritiana, lam. w. .	1	8
Linum africanum, l. g. .		6
= triginum Boxb. g. .		8
Lobelia frutescens, Wendl. g.		8
= longiflora, l. w. . .		6
Lonicera japonica, Th. g. .		6
= purpurascens. H. Angl. g.		16
Lubinia atropurpurea, H. Berol. g.		12
Malpighia coccifera, L. w. .		12
= glabra, L. w. . . .		12
= urens, Mill. w. . .		12
= volubilis: Sims. w. .		16
Malva fragrans: Jacq. g .		6
= lactea Ait. g. . .		6
Manulea tomentosa, L. g. .		8
Maranta Zebrina, Sims. w. .		16

	Rthl.	gr.
Melaleuca armillaris, Smith. g.		8
= calycina, R. Br. g.		12
= canescens, Otto. g.		8
= decussate, R. Br. g.		12
= densa R. Br. g.		12
= diosmifolia, Andr. g.		8
= fulgens, R. Br. g.		16
= genistifolia, Smith. g.		8
= hypericifolia, Smith g		12
= imbricata Link. g.		12
= linariifolia. Smith. g.		8
= nodosa. Smith. g.		8
= parviflora. Otto. g.		12
= pulchella. B. Br. g.		16
= squarrosa. Smith. g.		12
= stipheloides, Smith. g.		12
= thymifolia. Smith. g.		12
= thymoides: Labill. g.		8
Melampodium divaricatum H. Holl. g.		12
Melodinus scandens: Forst. w.		8
Menziesia polifolia, Jass. g.		6
Mesembryanth. albidum. L. g.		8
= aurantium. Haw. g.		6
= coelamiforme. L. g.		8
= dolabriforme. L. g.		6
= obconellum. Haw. g.		8
= pugioniforme. Haw. g.		6
= quadrifidum. Haw. g.		6
= Salmii. Haw. g.		8
= tuberosum. Haw. g.		8
50 verſchiedene Sorten in Steklinge à		4
Metrosideros crassifolia. Hortal. g		8
= lanceolata. Smith. g.		8
= linearis: Smith g.		8
= myrtifolia. Hortal. g.		12
= pinifolia. Wendl. g.		8
= rugulosa. W. g.		16
= saligna. Smith. g.		8
= stricta. Wendl. g.		12
Mikania Houstonis. Wild. w.		6
Mimulus glutinosus. Wendl. g.		6
Murraya exotica. L. w.		16
Myoporum ellipticum. R. Br. g		8
= parvifolium. R. Br. g.		8
= tuberculatum. R. Br. g.		8
= viscosum. R. Br. g.		6
Myrica cordifolia. L. g.		16
= Toya. Ait. g.		8
= laciniata. W. g.		12

	Rthlr.	gr.
Myrica quercifolia, L. g.		12
= segregata Jacq. g.		12
= serrata. Lam. g.		12
Nerium odoratum. Lam. g. (N. speciosum)	1	—
Ononis crispa. Th. g.		6
Orontium japonicum. Th. g.		4
Osteospermum coeruleum. Ait. g.		6
= monoliferum. L. g.		6
Othonna Athanasiae. L. g.		8
= coronopifolia. L. g.		6
Pancratium fragrans. Salisb. w.		16
= zeylanicum. L. g.		8
Passerina filiformis. L. g.		8
pectinata. Angl. g.		8
spicata. Th. g.		8
Passiflora holosericea. L. w.		8
= maliformis. L. w.		12
= serratifolia. L. w.		8
= palmata. H. Angl. g.		12
Pavetta indica. L. w.		16
Pelargonium abrotanifolium Jacq. g.		8
= acerifolium. L. H. g.		6
= amplissimum. Wendl. g.		8
= angulosum, Ait. g.		8
= ardens. Hortal. g.		12
= augustum. Link. g.		12
= balsameum. Jacq. g.		8
= betulinum. Ait. g.		6
= bicolor. Ait g.		12
= canariense. W. g.		8
= capitatum. Ait. g.		6
= carnosum. Ait. g.		12
= comptonianum. Hortal. g.		12
= concavifolium. Wendl. g.		8
= conduplicatum. W. g.		6
= cordatum. Ait. g.		6
= cr spum. L'H. g.		6
= cucullatam. Ait. g.		6
= cuspidatum. W. g.		6
= cynosbatifolium. W. g		6
= delphinifolium. W. g.		8
= echinatum. Cart. g.		8
= elegans. W. g.		8
= fuscatum. Jacq. g.		8
= gibbosum. Ait. g.		6
= glaucum. L'H. g.		12
= gratum. W. g.		8
= hermanifolium Jacq.		8

	Rthlr.	gr.
Pelargonium humile, Hortal. g		6
= incisum, W. g		6
= lateripes, L'H. g.		6
= malvaefolium, Jacq. fol.		6
= marginatum, Link. g		6
= monstrum, Ait. g		6
= nobile, Hortal. g.		8
= nothum, W. g		6
= optabile, Sweet. g		6
= peltatum, L'H. g		8
= penicillatum, W. g		8
= pulchellum, W. g		8
= quercifolium, L'H. g		8
= quinquevulnerum. W. g	1	—
= reniforme, W. g		6
= rubens Wendl. g		8
= sanguineum, Wendl. g		12
= scandens, Ehrh. g		6
= scutatum, L. et O. g		6
= sidaefolium, Jacq. fol. g		6
= spectabile, Sweet. g		8
= ternatum, Jacq. g		6
= tetragonum, L'H. g		8
= tomentosum, Jacq. g		6
= tricuspitatum, L'H. g		3
= triste, L'H. g		8
Periploca laevigata, Ait. g		6
Phormium, tenax, L. g		6
Phylica acerosa, W. g		8
= buxifolia, Mill. g		8
= ericoides, L. g		8
= paniculata, W. g		8
= = latifolia g		8
= pubescens, Wendl, g		16
= rosmarinifolia, Lam. g		8
= spicata, Anglor. g		16
= thymifolia. Vent. g		12
Phyllanthus acuminatus, Vat. w		8
Pinus Penia, L. g		8
Piper aduncum, Jacq. w.		6
= Bredemeyeri, Jacq. fol. w.		8
= geniculatam, Swarz w.		6
= incanum, L. et O. w,		8
= prunifolium, Jacq. fol. w.		8
= sidaefolium, L. et O w.		12
Pisonia aculeata, L. w.		8
= nitida, W. w.		8
Pitcairnia angustifolia, Ait.		8
= bromeliaefolia, L'H. w.		8
= latifolia, Ait. w.		8

	Rthl.	gr.
Pittosporum Tobira. Ait. g.	—	8
- undulatum Andr. g .	—	8
Plectranthus furcatus. H.B. w.		6
- incanus. H. Angl. w. .	—	6
Podalyria calyptrata. W. g	—	12
- hirsuta. W. g . .	—	12
- myrtillifolia. W. g .	—	12
- styracifolia. Bot. Mag. g	—	12
Podocarpus elongatus. L'M. g	8	
Polygala myrtifolia. L g	—	16
- speciosa. Ker. g . .	1	—
Pomaderris apetala. Labill. g	8	
Pothos digitata. Jacq. w.	—	16
- lanceolata. L. w. .	—	16
- violacea. Sw. w. .	—	12
Psiadia glutinosa. Jecq. g	—	6
Psidium pyriferum L. w.	—	6
Psoralea bracteata. L. g	—	6
Psychotria undata. Jacq. w.	—	8
Pteris arguta. Ait. w. .	—	8
- longifolia. L. w. .	—	6
- nemoralis. W. w. .	—	6
Pterosperm. suberifol. W. w	1	—
Puuica nana. Mill. g. .	—	12
Raphiolepes indica. Lindly. g	12	
Rauwolfia glabra. Cav. w.	—	8
Rhapis flabelliformis. A. w.	—	8
Rhipidodendr. distichum W. g	16	
Rhododendr. maximum. L. g	12	
- ponticum. L. g . .	—	12
- punctatum. Donn. g	1	—
Rhus crenata Th. g .	—	6
- cuneifolia. Th. g .	—	6
- glauca. Pers. g . .	—	6
- lacerum. L. g. . .	—	6
- nervosum. Pers. g .	—	6
- undulatum. Jacq. g. .	—	6
- villosum. Th. g. .	—	6
Rondeletia raccemosa Sw. w.	8	
Rosa. Banksiae. Ait. g .	—	8

	Rthlr.	gr.
Rosa bracteata. Wendl. g	—	6
- Laurantia Angl. g .	—	8
- multiflora. Th. g. .	—	8
- parviflora g. . .	—	8
- Roxburgiana. Hortal g	—	8
- salicifolia. Angl. g	—	8
Royena laevigata. g .	—	8
- lucida. L. g. . .	—	12
- myrtifolia g . .	—	8
Ruellia coccinea. w. .	—	8
- formosa. Andr. w. .	—	8
- tetragona. Link w. .	—	8
Saccharum officinarum L. w.		12
- violaceum. Toss. w. .	—	8
Sagittaria lancifolia. L. w.	—	16
Salvia aurea. L. g . .	—	6
- Boosiana. Jacq. fol. w.	—	6
- caesia. H. et B. g .	—	6
- splendens: Sello w. .	—	12
Scaevola suaveolens. R.Br. g	—	6
Schotia speciosa. Ait. w.	—	16
Scopolia aculeata. Smith. w.		6
Seguiera americana. L. w.	—	16
Selago fasciculata. L. g	—	8
Selinum decipiensis. Sch. et W. g .	—	4
Senecio scabra. W. g. .	—	6
Sederoxyllon atrovir Lam. w.		12
Sisyrinchium iridifolium H. et K. g .	—	4
- luteum. Fischer. g .	—	4
Solanum amazonium. Ker. w.		8
- argenteum. Dunal. w.	—	8
- betaceum. Cav. g. .	—	6
- ferrugineum. Jacq. w.	—	6
- havanensis. L. w. .	—	6
- stellatum. Jacq. w. .	—	8
- tomentosum. L. w.	—	6
- Vespertilio. Ait. g .	—	6
Solondra grandiflora Sw. w.	—	8

	Rthlr.	gr.
Sparmannia africanna. L. g	—	8
Staehelina Chamaepeuce L g		6
- gnaphaloides: g .	—	8
Sterculia platanifolia. L. g	—	12
Struthiola glabra. L. g	—	12
- virgata. L. g. . .	—	8
Stylidium fruticosum. R.Br. g		6
Tanacetum canariense. D'C. g		4
Tarchonanthus camphoratus L. g. .	—	6
Taxus macrophyllus Th. g	—	8
- nucifera. L. g. . .	—	8
Templetonia glauca R.Br. g	1	16
- retusa. R. Br. g . .	1	—
Thea Bohea. L. g . .	1	—
Thuja plicata. Hortol. g .	—	8
Tillandsia amoena. Lodd. w.		16
- tigulata L. w. . .	—	16
Tournefortia hirsutissima Mill. w. .	—	8
- laurifolia. Vent. w. .	—	8
- mutabilis. Vent. w. .	—	8
Triplaris americana. L. w.	1	—
Tristanea nereifolia. R. Br. g		16
Ulmus parvifolia. Jacq. g	—	6
Urtica crassifolia. W. w.	—	6
Varronia curassavica. Jacq. w.		8
Veronica decussata. L. g	—	4
Viburnum odoratissimum Ker. g .	—	12
- strictum. Link. g .	—	12
Visnea Mocanera. L. g.	—	12
Vitex ovata. Th. w. .	—	4
Wachendorfia thyrsiflora. Mill. g .	—	8
Wensia pyramidata. W. w.	—	8
Xenopoma obováta. g .	—	6
Zamia integrifolia. Ait. w.	3	—
Zygophyllum foetidum. Wendl. g. .	—	8

Bemerkungen:

1) Ohne baare Bezahlung wird nichts verabfolget. 2) Briefe und Gelder werden Postfrei erwartet. 3) Ohne deutliche Addresse wird nichts verschikt. 4) Die Emballage muß vergütet werden. 5) In diesem Auszuge befinden sich die seltenern Pflanzen. Sollte Jemand das ganze Verzeichniß zu haben wünschen, so darf er sich an den Garten-Inspektor Wendland und den Gartenmeister Mertens wenden, welche auch die Bestellungen annehmen. 6) Die bei den Sorten befindlichen Buchstaben bedeuten g. Pflanzen die 1 bis 10 Grad (Reaumur) Wärme erfodern, w. Pflanzen die über 10 Grad verlangen.

In Commission bei Fr. Pustet in Paßau. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter an.

Der ganzjährliche Preis ist in ganz Deutschland 2 fl. 24 kr. ohne, und 2 fl. 44 kr. R. W. mit Couvert — portofrei.